



# ЯК ВИЖИТИ ПІД ЗАВАЛАМИ

Поради від Госпітальєрів та ДСНС

DOVIDKA.INFO

ГОСПІТАЛЬЄРИ

# НЕ ІГНОРУЙТЕ СИГНАЛ ТРИВОГИ, СПУСКАЙТЕСЯ В УКРИТТЯ.

Якщо ви опинились під завалом,  
пам'ятайте, що до місця події завжди  
залучені відповідні екстрені служби.

Подавайте будь-які можливі сигнали:  
крик, свист, стукіт, світло.



# У «ХВИЛИНУ ТИШІ»

продовжуйте подавати сигнали  
для рятувальників.

«Хвилина тиші» – це короткий проміжок часу, протягом якого всі люди й техніка припиняють будь-які звуки або рухи, щоб дати змогу рятувальникам почути сигнали людей під завалами.



ГОСПІТАЛЬЕРИ

**! Ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху/пожежі.**

Вкрай важливо **не зрушити перекриття чи балки**, на яких все тримається. Тому не намагайтесь самотужки розбирати завали довкола себе.

Якщо вам вдалося безперешкодно вибратися – огляньте себе на наявність травм. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.



**ГОСПІТАЛЬСЬКИ**

# ЩО РОБИТИ, ЯКЩО КІНЦІВКА ЗАТИСНЕНА ЗАВАЛОМ:

Якщо затиснуту кінцівку легко звільнити – зробіть це обережно.

Якщо кінцівку затисло так,  
що її звільнення вимагає допомоги  
інших людей та спецзасобів,  
**перед вивільненням накладіть турнікет.**

Адже завал міг спричинити масивну  
кровотечу чи синдром тривалого  
стиснення.

! Кінцівку, затиснуту **понад 2 години**  
не можна вивільняти самостійно.

# ЧОМУ ВАЖЛИВО НЕ ВИВІЛЬНЯТИ КІНЦІВКУ САМОСТІЙНО?

**Тривале стиснення = зупинка кровообігу.**

Клітини гинуть, накопичуються токсини.  
Коли тиск знято, токсини потрапляють  
у кров.


Це може спричинити гостру  
ниркову недостатність, порушення  
серцевого ритму, смерть.

**ЯК ДІЯТИ ПРАВИЛЬНО,  
ЯКЩО КІНЦІВКА  
ЗАТИСНУТА ПОНАД  
2 ГОДИНИ АБО МАЄ  
МАСИВНУ КРОВОТЕЧУ.**

Накладіть турнікет вище місця стиснення або поранення на 5-8 см, але не на суглоб.

**Не знімайте самостійно –  
це має зробити медик.**

**Позначте час** накладання водостійким маркером.



# УНИКАЙТЕ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ.

Якщо є **поранення** й **втрата крові**,  
**то важливо зберігати тепло** навіть при  
зовнішній температурі +30.

Коли крові в тілі меншає, організм  
втрачає здатність самостійно  
підтримувати належну температуру.

**При охолодженні тіла відбуваються**  
**процеси, які можуть привести до смерті:**

- Порушується робота серця й судин
- Дихання сповільнюється,  
виникає гіпоксія
- Страждає мозок – плутанина,  
сонливість, втрата свідомості
- Згортання крові погіршується –  
кровотечі важко зупинити

# ЩО РОБИТИ?

Використовуйте все, що затримує тепло:  
термоковдра, одяг, рушники, ковдри.

Зберігайте тепло в області грудей, шиї  
та голови – саме там тіло втрачає  
найбільше тепла.

Не лягайте просто на землю чи бетон –  
підкладіть щось під себе.

Не пийте алкоголь – він створює ілюзію  
тепла, але насправді прискорює  
охолодження.

# ЩО ТРИМАТИ БІЛЯ ЛІЖКА НА ВИПАДОК ОБСТРІЛУ.

Обстріли часто трапляються вночі.  
У вас може не бути часу – речі мають  
лежати під рукою.

Тривожний мінімум:

- аптечка (кровоспинні засоби: турнікети, бинти для тампонування, бандажі, атравматичні ножиці, термоковдри, водостійкий маркер тощо)
- Ліхтарик
- Пляшка води
- Павербанк
- Свисток

# НЕ ПОКЛАДАЙТЕСЯ НА ІНТУІЦІЮ –

навчіться правильно користуватися  
засобами з вашої аптечки.

Запишіться на курси домедичної  
допомоги.

Збережіть ці поради та поділіться  
з рідними.



ГОСПІТАЛЬЕРИ